

¿En qué consiste la alimentación por sonda nasoyeyunal con bomba de alimentación?

La sonda nasoyeyunal es un tubo delgado y blando que se coloca por la nariz, pasa por el estómago y termina en el yeyuno, una parte del intestino delgado.

¿Qué debo saber sobre la sonda nasoyeyunal?

- Un médico coloca la sonda nasoyeyunal con rayos X.
- No la pueden cambiar los cuidadores del paciente en el hogar.
- Para administrar los alimentos a través de la sonda nasoyeyunal, hay que usar una bomba.
- No se pueden dar alimentos en bolos por este tipo de sonda.
- La sonda se sujeta en la mejilla con cinta.



¿Cómo sé que la sonda está en el lugar correcto?

- Haga una marca en la sonda con un marcador en el lugar en el que sale de la nariz. De esa forma, puede saber si se movió hacia adentro o hacia afuera.
- Mida la longitud externa visible de la sonda, desde la nariz hasta el extremo de la sonda.
- Antes de administrar alimentos, controle la marca de la sonda o mida la longitud externa visible para asegurarse de que esté en el lugar correcto.

¿Cómo administro los alimentos?

1. Lávese las manos con agua y jabón.
2. Revise las órdenes del médico correspondientes al plan de alimentación y las instrucciones sobre cómo enjuagar la sonda nasoyeyunal.
3. Reúna los materiales y el equipo:
 - Bomba de alimentación
 - Kit de administración de alimento
 - Portasueros
 - Fórmula
 - Biberón o recipiente para medir la fórmula
 - Jeringa pequeña (de 3 ml o 5 ml)
 - Agua
4. Abra el kit de administración de alimento.
 - Use un kit nuevo cada 24 horas.

5. Agregue la fórmula a la bolsa.
6. Prepare o llene con fórmula el catéter del kit de administración de alimento.
7. Coloque el catéter en la bomba de alimentación.
8. Encienda la bomba.
9. Consulte las instrucciones de la bomba de alimentación para programarla.
 - Establezca el ritmo, es decir, la velocidad a la que se administrará el alimento.
 - Establezca la dosis, es decir, la cantidad de fórmula que se administrará.
10. Compruebe que la sonda nasoyeyunal esté en el lugar correcto.
11. Administre una pequeña cantidad de agua para enjuagar la sonda nasoyeyunal y asegurarse de que esté abierta.
 - Revise las órdenes del médico para saber la cantidad de agua que se debe usar.
12. Conecte el catéter del kit de administración de alimento a la sonda.
13. Abra la pinza del catéter.
14. Inicie la bomba de alimentación.

¿Qué más debo recordar?

- Nunca agregue fórmula nueva a la que ya esté en la bolsa de alimentación. Deseche la fórmula vieja antes de agregar fórmula nueva.
- Enjuague la sonda de alimentación con 1 ml a 5 ml de agua antes y después de administrar medicamentos para evitar obstrucciones.
- Es importante que su bebé o niño(a) tenga sensaciones agradables durante la alimentación: téngalo(a) en brazos y deje que use un chupete, que se siente en una silla alta y que participe en las comidas de la familia.
- Pregunte a su médico o enfermero(a) acerca de la terapia para mejorar las habilidades orales.

Llame al médico si:

- su hijo(a) está incómodo(a) o irritable durante la sesión de alimentación
- su hijo(a) vomita o tiene diarrea
- su hijo(a) tiene el estómago hinchado o distendido
- la sonda se movió o se salió

Última actualización: diciembre de 2023, por Kim Sobel, RN, especialista en educación

Marketing Use Only (For Spanish language translations only, please translate the text below in red):

Navigation Text: **Alimentación por sonda nasoyeyunal con bomba de alimentación**

Meta Title: **Alimentación por sonda nasoyeyunal con bomba de alimentación | Consejos para los padres**

Meta Description: **Consulte la información sobre la alimentación por sonda nasoyeyunal con bomba de alimentación, proporcionada por los expertos de Cincinnati Children's.**