

Порядок послеоперационного бужирования
детей с диагнозом "атрезия ануса"

Альберто Пена
Кетлин О'Коннор

День операции

Родителям необходимо приобрести набор бужей Хегара, производящихся компанией "Jones Surgical Company, Inc.", находящейся по адресу 101-21 Metropolitan Avenue, Forest Hills, тел. (718) 261-9500.

Две недели спустя

Снять швы, выбрать нужный размер бужа и показать матери процесс бужирования. Размер бужа должен быть выбран таким образом, чтобы буж проходил спокойно. Выбранный буж передать матери и указать ей на необходимость строго соблюдать порядок бужирования, осуществляя данную процедуру два раза в день.

Каждую неделю

Ребенок доставляется в клинику, где ему вводят буж следующего размера. Данный буж передается матери с тем, чтобы она проводила бужирование два раза в день.

Когда буж максимально требуемого размера проходит нормально, колостома может быть закрыта, однако и после закрытия колостомы необходимо продолжать бужирование до тех пор, пока буж не будет проходить легко и безболезненно. Обычно на это требуется 3-4 недели со дня первого введения бужа максимально требуемого размера.

Когда мать сообщает о том, что буж входит легко и безболезненно (дважды в день), можно постепенно сокращать частоту бужирования:

- Один раз в день в течение месяца,
- Каждый второй день в течение месяца,
- Каждый третий день в течение месяца,
- Дважды в неделю в течение месяца,
- Один раз в неделю в течение месяца,
- Один раз в месяц в течение трех месяцев.

Если в какой то момент данного периода буж будет проходить с трудом, появится боль или кровь, то процесс бужирования необходимо повторить, вернувшись к начальному бужированию дважды в день.

Обычно бужирование может причинять боль при введении бужей последних двух-трех размеров. Именно в этот период родители начинают просить хирурга не причинять боли ребенку. Хирург может пойти навстречу пожеланиям родителей и согласиться проводить бужирование один раз в неделю. Это крайне нежелательно. Поступая таким образом, мы провоцируем образование разрывов (трещин), которые в течение недели затягиваются, а затем при последующем бужировании появляются снова, что приводит к образованию жестких рубцов.

С другой стороны, длительное бужирование (более недели) бужом одного и того же размера приводит к тому, что развивается процесс сужения ануса до данного размера, что существенно затрудняет дальнейшую процедуру бужирования.

Бужирование затрудняется в случае, если прооперированная кишка плохо питается кровью.

Максимально требуемые размеры бужей Хегара в зависимости от возраста:

1-4 месяца	12
4-8 месяцев	13
8-12 месяцев	14
1-3 года	15
3-12 лет	16
Старше 12 лет	17

Буж вводится на глубину около 2 инчей (5 см).