


ما هو قياس الضغط الشرجي؟

يوجد عضلتان صغيرتان في فتحة الشرج (فتحة من المستقيم) تساعدان في التحكم في حركة الأمعاء. تُعرف هاتان العضلتان بالعضلات العاصرة الداخلية والخارجية. (الأشكال 1 و 2)
تتغلق هاتان العضلتان بصورة طبيعية للوقاية من تسريب البراز الخارج عن الإرادة. وللتبرز يجب أن ترتخي تلك العضلتان وتُفتحان في نفس الوقت. قياس الضغط الشرجي هو اختبار يدرس كيفية عمل هاتين العضلتين.




قبل إجراء الاختبار

- اشرح لطفلك كيف يتم الاختبار في الوقت الذي ترى أنه الأنسب لذلك. ستساعدك الممرضة في هذا الشأن.
- سيتم إبلاغك بالطريقة والوقت المحدد لإعطاء طفلك حقنة شرجية أو تحاميل قبل الاختبار.
- من المفيد أن تحضر اللعبة المفضلة لطفلك ليشعر بالراحة أكثر أثناء الإجراء.
- خدمات حياة الطفل (Child Life) متاحة من أجل الاختبار

أثناء الاختبار

- سيتم إخبارك بمكان التسجيل للاختبار. سيوجهك أحد الموظفين إلى المبنى الذي يُجرى فيه الاختبار.
- سترتدي الممرضات أردية وقفازات ونظارات بلاستيكية.
- سيحتاج طفلك إلى نزع سرواله وملابسه الداخلية. سيطلب منه أن يستلقي على جانبه الأيسر فوق الطاولة. من المهم أن يظل طفلك مستلقيًا أثناء الاختبار.
- يتم إدخال أنبوب به بالون داخل المستقيم. (الشكل 4) ينتفخ البالون ببطء
- الأنبوب متصل بحاسوب يعرض رسم بياني. يسجل الحاسوب مدى جودة عمل العضلات حول فتحة الشرج.
- أثناء الاختبار، يمكن أن يكون الوالدان مع طفلهما أو ينتظرا في ساحة الانتظار.
- سيستغرق الاختبار حوالي 45 دقيقة.



ما سيتم إجراؤه لطفلك

- ستزداد وتنقص كمية الهواء الموجودة في البالون عدة مرات أثناء الاختبار. عندما تزداد سيشعر طفلك بما يشبه أن لديه حركة أمعاء. سيستمر هذا الشعور الملح لبضع ثوان فقط ثم ينتهي بمجرد أن تتغير كمية الهواء الموجودة بالبالون.
- بالنسبة للطفل الأكبر سنًا يمكن أن يُطلب منه أن يخبر الممرضة بما يشعر به أثناء الاختبار.

بعد إجراء الاختبار

- يمكن أن يعود طفلك إلى نظامه الغذائي العادي وأن يلعب ويمارس الأنشطة المعتادة.
- سيقام طبيب طفلك بنتائج الاختبار معك في غضون أسبوع إلى أسبوعين.