


## ما هو قياس ضغط القولون؟

الغرض من قياس ضغط القولون هو تحديد مدى كفاءة عمل القولون لدى طفلك. القولون يعرف أيضاً باسم الأمعاء الغليظة. هذا هو المكان الذي يتم فيه تكوين البراز وتخزينه ثم إخراجها.

جهاز قياس الضغط هو لقياس الضغط أو الانقباضات في الأمعاء الغليظة.

### قبل إجراء الاختبار

- إذا كان طفلك كبيراً بما يكفي، فاشرح لطفلك كيف يتم إجراء الاختبار في الوقت الذي تشعر أنه الأفضل. ستساعدك الممرضة في هذا الشأن.
- قد يكون مفيداً أن يحضر طفلك معه ألعابه المفضلة. هذا سيجعل طفلك مرتاحاً أكثر أثناء الاختبار.



- قد تتداخل بعض الأدوية مع هذا الاختبار. قد يُطلب منك إيقاف بعض الأدوية قبل الاختبار.
- طمئن طفلك بأنك ستكون حاضراً طوال فترة الاختبار.
- سيتم إجراء تنظيف الأمعاء داخل المستشفى لتنظيف القولون قبل وضع قسطرة قياس الضغط.
- سيتم إدخال طفلك الى المستشفى لتنظيف الأمعاء في اليوم السابق لوضع القسطرة.
- اطلع على نشرة تنظيف الأمعاء لمزيد من التفاصيل.

## أثناء الاختبار

- سيقوم أخصائي تخدير أطفال بإعطائه غاز مخدر يساعد طفلك على النوم أثناء الاختبار.
- سيتم إعطاء طفلك سوائل بالحقن الوريدي للحفاظ على ترؤية جسده.
- سيضع الطبيب الأنبوب الذي سيستخدم في هذا الاختبار. يمر الأنبوب عبر المستقيم إلى القولون. يتم وضع هذا الأنبوب باستخدام منظار القولون. منظار القولون عبارة عن أنبوب يشبه الخرطوم مزود بضوء وكاميرا في نهايته يستخدم لفحص داخل القولون. سيتم بعد ذلك إخراج منظار القولون وترك الأنبوب داخل القولون. سوف يمتد من أعور القولون، عبر المستقيم، ويتم تثبيته في مكانه بشريط لاصق على فخذ طفلك الداخلي.
- سيذهب طفلك إلى غرفة الإفاقة (Recovery Room) أو غرفة الاستيقاظ للاستيقاظ من التخدير. سيتم بعد ذلك اصطحاب طفلك إلى غرفة لإكمال بقية الاختبار.
- سيحتاج طفلك إلى البقاء في السرير لبقية ذلك اليوم وجزء من اليوم التالي.
- يجب أن يستخدم طفلك وعاء التبول في الفراش أو مبلولة أو حفاضات بدلاً من الذهاب إلى دورة المياه.
- لن يُسمح لطفلك بأكل أو شرب أي شيء لبقية اليوم وجزء من اليوم التالي. السوائل الوريدية ستحافظ على جسم طفلك رطبًا.
- لبقية المساء، سيكون لطفلك الحرية في القيام بأي أنشطة يمكنه القيام بها في السرير. سيبدأ الاختبار الفعلي في وقت مبكر من صباح اليوم التالي.
- سيتم توصيل الأنبوب بعربة قياس الضغط المحمولة. وهي متصلة بكمبيوتر. يطلع الطبيب على هذه المعلومات بعض الانتهاء من الاختبار.
- سيتم إعطاء طفلك وجبة ودواء كجزء من الاختبار. يُرجى عدم السماح لطفلك بالأكل أو الشرب حتى يقوم فريق تمريض قياس ضغط القولون بتوجيهك بذلك.
- سيستمر الاختبار لمدة ست ساعات تقريبًا.

## بم سيعشر طفلي أثناء الاختبار؟

- لا يسبب هذا الاختبار ألمًا، ولكن في بعض الأحيان قد يصاب الطفل ببعض التقلصات عند إعطائه أدوية لتحفيز القولون أثناء الاختبار.
- في بعض الأحيان قد تتسرب كمية صغيرة من الماء من مؤخرة طفلك أثناء الاختبار.
- عند اكتمال الاختبار، نزيل الشريط الذي يثبت الأنبوب في مكانه ثم نزيل الأنبوب. قد تكون إزالة الشريط غير مريحة.
- إزالة الأنبوب ليست مؤلمة.

## بعد إجراء الاختبار

- قد يعود طفلك إلى نظامه الغذائي العادي واللعب والعودة إلى الأنشطة العادية.
- سيناقش طبيب طفلك نتائج الاختبار معك في غضون أسبوع إلى أسبوعين.

Last Updated: 03/2023 by Jessica Bell, RNIII

Marketing Use Only (For Spanish language translations only, please translate the red text below):

Navigation Text: **Colonic Manometry**

Page Title: **Colonic Manometry | Medical Examination**

Meta Description: **A colonic manometry test is done to determine how well your child's colon works. Learn more about what to expect before, during and after the test.**

URL: /health/c/colonic-mano