


التنظير الداخلي للجهاز الهضمي

التنظير الداخلي للجهاز الهضمي (GI) (Gastrointestinal) - (يعرف باسم "منظار") هو فحص خاص يتيح للطبيب إلقاء نظرة على بطانة الجهاز الهضمي لطفلك. المنظار الداخلي هو أنبوب طويل ورفيع ومجوف مزود بكاميرا خاصة وضوء في نهايته. يستخدم الطبيب هذه الكاميرا للنظر في الجهاز الهضمي من الداخل. أجزاء الجهاز الهضمي التي يمكن لطبيبك النظر إليها من خلال المنظار هي:



- الفم
- المريء
- المعدة
- الأمعاء الدقيقة
- الأمعاء الغليظة

أحياناً، يحتاج الطبيب إلى النظر إلى الجزء العلوي فقط من الجهاز الهضمي (المريء والمعدة وأعلى الأمعاء الدقيقة). أحياناً، قد يحتاج الطبيب إلى النظر في الجزء السفلي من الجهاز الهضمي فقط (الأمعاء الغليظة والجزء السفلي من الأمعاء الدقيقة). في أوقات أخرى، سيحتاج الطبيب إلى فحص كل من الجهاز الهضمي العلوي والسفلي.

موقع إجراء اختبار تنظير الجهاز الهضمي

المستشفى الرئيسي (3333 Burnet Avenue, Cincinnati)

- المبنى B الطابق الثالث، قسم جراحة اليوم الواحد (Same Day Surgery)
- مركز إجراءات الجهاز الهضمي (GI Procedure Center) المبنى A الطابق الثالث

مجمع ليبرتي (Liberty Campus) (7777 Yankee Road, Liberty Township)

- الطابق الثاني، جراحة اليوم الواحد

مدة المكوث في المستشفى

يبلغ إجمالي الوقت الذي سيقضيه الطفل في المستشفى حوالي أربع ساعات يتضمن ذلك؛ الوقت قبل المنظار والوقت اللازم لاستيقاظ الطفل بعد المنظار.

إذا تم إجراء المنظار بمبنى بيرنت أفينيو (Burnet Avenue):

- يرجى الحضور قبل 90 دقيقة من بدء المنظار

للمناظير التي ستجرى في مجمع ليبرتي:

- يرجى الحضور قبل 60 دقيقة من بدء المنظار

الجولات المصحوبة بمرشدين:

إذا كان طفلك يرغب في تحديد موعد لجولة في قسم جراحة اليوم الواحد وغرفة العمليات (Operating Room) وغرفة الإفاقة (Recovery Room)، يرجى الاتصال على 513-636-8298 لتحديد موعد جولة إرشادية.

المخاطر المصاحبة للإجراء:

التنظير الداخلي هو إجراء آمن. قلة من الأطفال يعانون من مضاعفات غير متوقعة أو خطيرة.

بعد المنظار، قد يكون يصاب معظم الأطفال بما يلي:

- ألم خفيف في الحلق
- ألم بسيط في البطن، لأنهم يحتاجون إلى إخراج الغازات.

تشمل مخاطر المنظار ما يلي:

- نزيف من مواقع الخزعة
- انثقاب أو ثقب في الأمعاء
- استخدام التخدير
- العدوى
- إصابة جزء من الجسم قريب من مكان التنظير.

خطر حدوث مضاعفات ضئيل جدا. سيقوم فريق الرعاية الصحية الخاص بك بمراجعة هذه المخاطر بمزيد من التفاصيل أثناء زيارتك للعيادة. ستقضي أيضًا بعض الوقت مع فريق التخدير الخاص بطفلك في جراحة اليوم الواحد في يوم الاختبار.

يرجى الاتصال بمكتبنا على الرقم 513-636-4415 إذا كان طفلك يعاني من ألم شديد، أو حمى تصل إلى 100.5 فهرنهايت أو أكثر أو إذا كان لديك أي أسئلة / مخاوف بعد المنظ

قبل إجراء المنظار

- يجب عدم استخدام منتجات الأسبرين (Aspirin) أو الإيبوبروفين (Ibuprofen) أو موترين (Motrin) أو أدفيل (Advil) أو أليف (Aleve) لمدة أسبوعين قبل المنظار
- يجب إزالة جميع المجوهرات من أي مكان في الجسم ومن ثقب الجسم
- يجب إزالة طلاء الأظافر
- إذا كان طفلك يرتدي العدسات اللاصقة، فقم بإزالة العدسات اللاصقة (ولكن تأكد من إحضار نظارات طفلك)
- يجب إجراء فحص بدني في غضون 30 يومًا من المنظار
- إذا كان طفلك بحاجة إلى مسكنات للألم قبل استخدام المنظار، فيمكن استخدام تايلينول (Tylenol) (أسيتامينوفين - Acetaminophen).
- تأكد من الممرضة إذا كان طفلك يأخذ أدوية روتينية كل يوم.

- يجب إعطاء أجهزة الاستنشاق للربو في الوقت المعتاد.
- راجع الأدوية التي يتناولها الطفل مع فريق الجهاز الهضمي، فقد تحتاج أيضاً إلى إيقاف بعض الأدوية الأخرى قبل المنظار.

اتصل بطبيب طفلك إذا:

- أصيب طفلك بحمى تصل إلى 100.5 فهرنهايت أو أكثر، أو سعال أو كان مريضاً في غضون 7 أيام من المنظار
- تعرض طفلك لمرض معدٍ (مثل جدري الماء) قبل المنظار

تعليمات النظام الغذائي وأمثلة عليه

سيحتاج الأطفال الذين يخضعون لتنظير القولون إلى نظام غذائي خاص وإعداد الأمعاء. سيقوم فريق الجهاز الهضمي المتابع بمراجعة هذه التعليمات الخاصة معك

للأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد الخاضعين لتنظير الجزء العلوي للجهاز الهضمي:

- أوقف كل أنواع حليب الرضع الصناعي والحليب والأطعمة قبل 5 ساعات من موعد الوصول المحدد إلى المستشفى.
- قد يتناول الأطفال السوائل الشفافة فقط غير الحمراء حتى 3 ساعات قبل موعد الوصول المحدد إلى المستشفى (بدون مكثفات أو إضافات).
- أوقف الرضاعة الطبيعية بلبن الأم والسوائل الشفافة قبل 3 ساعات من موعد الوصول المحدد إلى المستشفى

للأطفال بعمر 1 سنة فأكثر الخاضعين لتنظير على الجهاز الهضمي العلوي:

- أوقف جميع أنواع الحليب والأطعمة الصلبة والمكثفات/الإضافات والحلوى والعلكة قبل 7 ساعات من موعد الوصول المحدد إلى المستشفى
- قد يتناول الأطفال السوائل الشفافة فقط غير الحمراء حتى 3 ساعات قبل موعد الوصول المحدد إلى المستشفى (بدون مكثفات أو إضافات).
- أوقف جميع السوائل الشفافة قبل 3 ساعات من موعد الوصول المحدد إلى المستشفى

أمثلة عن السوائل الشفافة: (يجب ألا تكون السوائل الشفافة حمراء اللون)

- الماء
- عصير التفاح أو أي عصير آخر خالٍ من لب الفاكهة
- ماء الجلوكوز
- المشروبات الغازية (كولا)
- لبن الأم
- مصاصات مثلجة
- محلول بيديالايت (Pedialyte®)
- جيلي (Jell-O®)
- شراب جاتوريد (Gatorade®)
- شراب كول إيد (Kool-Aid®)

تذكيرات:

- يرجى العلم أن عصير البرتقال ليس سائلاً شفافاً
- تأكد من مشاهدة طفلك وهو يغسل أسنانه بالفرشاة حتى لا يبتلع أي ماء أثناء غسل أسنانه.

Last Updated: 11/2021 per Jennifer Willoughby