

ما المقصود بالعلاج بالتستوستيرون قبل إصلاح الإحليل التحتي؟

الإحليل التحتي حالة شائعة تكون فيها فتحة الإحليل على الجانب السفلي من القضيب بدلاً من الطرف. ربما تم إخبارك أيضًا أن حجم قضيب طفلك غير طبيعي.

يمكن أن يؤدي العلاج الجراحي لحالة الإحليل التحتي إلى تغيير شكل القضيب ووظيفته. لا يوجد علاج لتصحيح حالة الإحليل التحتي. لن يتغلب طفلك على هذه الحالة.

قد يوصي طبيب المسالك البولية لطفلك بحقن التستوستيرون قبل إجراء الجراحة التصحيحية. تشير الأبحاث إلى أن إعطاء هذا الدواء قبل الجراحة سيساعد على:

- زيادة عرض القضيب
- زيادة طول القضيب
- زيادة عدد الأوعية الدموية

قد يؤدي ذلك إلى زيادة حجم القضيب، ما قد يحسن نتائج الجراحة.

التستوستيرون هو دواء يُعطى عن طريق الحقن في الجسم. وقد يصف طبيب طفلك إعطاءه التستوستيرون. سيحدد طبيب طفلك الجرعة التي سيتم إعطاؤها وعدد الجرعات التي سيحصل عليها طفلك.

على غرار أي دواء، قد تحدث بعض الآثار الجانبية مباشرة بعد الحقن، والتي سيتم مراقبتها في العيادة:

- احمرار وتورم في مكان الحقن
- قد تحدث ردود فعل تحسسية تجاه التستوستيرون، لكنها نادرة الحدوث. يُرجى إبلاغ فريق الرعاية الصحية المتابع لحالة طفلك بأي حساسية يعاني منها طفلك تجاه أدوية أخرى. سيُطلب منك البقاء في العيادة لمدة 30 دقيقة على الأقل بعد الحقنة.

التفاعلات غير الشائعة مع التستوستيرون التي قد تُلاحظ بعد مغادرة العيادة هي:

- احمرار القضيب
- زيادة التهيج لدى الأطفال الرضع والسلوك العدواني لدى الأطفال الأكبر سنًا
- زيادة حدوث الانتصاب
- نمو شعر العانة (الشعر الزغبي)

تستمر هذه الآثار فقط حتى يخرج الدواء من جسم طفلك، وقد يستمر ذلك لعدة أسابيع.

Reviewed By: Katie Potts, RN 2025/09