

سحب خزعة من الكبد

يتم سحب خزعة من الكبد لأخذ عينة صغيرة من أنسجة الكبد من أجل تشخيص مرض جديد في الكبد أو تغييرات في مرض معروف. إذا كان طفلك مُصابًا بمرض في الكبد، قد يساعد سحب خزعة من الكبد في معرفة كيفية استجابته للعلاج الطبي.

سيشرح الطبيب أو الممرضة الإجراء لك ولطفلك.

تجهيز طفلك لسحب خزعة من الكبد

عندما تكون في المنزل

- سيحصل طفلك على تعليمات خاصة متعلقة بتناول الطعام والمشروبات. سنخبرك عن ذلك عند حضورك لموعدهك.
- إذا كان طفلك يتناول دواء في الصباح اسأل الطبيب عما إذا كان من المقبول أن يتناوله قبل سحب الخزعة.
- سيتم إجراء اختبارات الدم لطفلك خلال أيام قليلة قبل سحب الخزعة أو في صباح يوم سحب الخزعة. يمكننا أيضًا إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للكبد.

عندما تأتي إلى المستشفى:

- سيشرح الطبيب الذي يقوم بسحب الخزعة من الكبد الإجراء ويخبرك عن أي استفسارات قد تطرأ على ذهنك.
- قبل سحب خزعة من الكبد سيتناول طفلك الأدوية لكي لا يشعر بالألم أو القلق. سيتحدث معك الطبيب الذي يعطي "دواء التتويم" لطفلك (يُسمى أخصائي التخدير) بشأن:
 - التاريخ الطبي لطفلك بما في ذلك الأدوية الحالية الخاصة به.
 - تجربة طفلك السابقة مع التخدير.
 - في معظم الأحيان يتلقى الأطفال سوائل تحتوي على الكهرال (سوائل الحقن الوريدي) عن طريق خط عبر الوريد (الحقن الوريدي) أثناء سحب الخزعة.

إجراء سحب خزعة من الكبد

- ينام طفلك تحت تأثير المخدر ولن يكون بمفرده أبدًا أثناء سحب خزعة من الكبد. هناك طريقتان مختلفتان لإعطاء المخدر:
 - يتم إعطاء الدواء عن طريق الحقن الوريدي.
 - استنشاق الطفل غازًا من خلال قناع أو ربما عن طريق أنبوب تنفس خاص.
- بعد أن يتم تخدير طفلك يتم استخدام الموجات فوق الصوتية للعثور على أفضل مكان لسحب الخزعة. يتم تنظيف المنطقة بصابون مضاد للبكتيريا وسيتم وضع دواء يخلد الإحساس على جلد منطقة الخزعة.
- بمجرد تخد الإحساس في المنطقة، يقوم الطبيب بإدخال إبرة عبر الجلد إلى الكبد، حيث يأخذ قطعة صغيرة من أنسجة الكبد.
- بعد الانتهاء من الخزعة، يتم وضع ضمادة صغيرة "للضغط" على المنطقة ثم يتم إيقاظ طفلك.

بعد سحب خزعة من الكبد

- بعد إجراء الخزعة، يبقى طفلك في غرفة العلاج أو منطقة الإفاقة حتى يستيقظ تمامًا. بمجرد استيقاظ طفلك، يعود إلى غرفته ليبقى تحت الملاحظة.
- يجب أن يبقى طفلك في السرير مستلقيًا على جانبه الأيمن أو ظهره لمدة 6 ساعات، اعتمادًا على موقع الخزعة. وهذا يساعد على تقليل خطر النزيف بعد إجراء الخزعة. إذا كان بحاجة إلى استخدام دورة المياه خلال هذا الوقت، فسوف تساعد الممرضة في استخدام وعاء التبول أو المبوطة.
- سيقوم الطاقم بفحص طفلك مرارًا خلال الساعات الأربع الأولى بعد إجراء الخزعة. سيرتدي طفلك جهازًا صغيرًا يفحص مستوى القلب والتنفس والأكسجين لمدة 6 ساعات على الأقل بعد إجراء الخزعة.
- بمجرد أن يعطي الطبيب الموافقة، يمكن لطفلك شرب السوائل عند استيقاظه واستقرار حالته. يستطيع طفلك أن يبدأ في اتباع نظام غذائي منتظم عندما يتمكن من تناول السوائل دون مشكلة.

- سيبقى أنبوب الحقن عبر الوريد في مكانه لمدة 6 ساعات على الأقل بعد إجراء الخزعة. بمجرد أن يأكل طفلك ويشرب بشكل جيد، نوقف السوائل الوريدية.
- يمكن لطفلك القيام بأنشطة هادئة في الغرفة لبقية اليوم.
- يرجى إحضار بعض الكتب أو الألعاب المفضلة لطفلك إلى المستشفى.
- قد يستطيع الطفل أن يعود للمنزل في نفس يوم إجراء الخزعة، ولكن هناك العديد من العوامل التي تساعد على اتخاذ هذا القرار. يرجى التحدث مع الفريق الطبي حول هذا الخيار.
- يجب على الطفل تجنب رفع أوزان ثقيلة تصل إلى 10 أرطال أو أكثر وممارسة الرياضات التي تتطلب الاحتكاك الجسدي لمدة 5 أيام بعد سحب خزعة الكبد.

متى ينبغي الاتصال بالطبيب

اتصل بالطبيب فورًا إذا لاحظت أيًا من الأشياء الآتية:

- أن طفلك يعاني من ألم شديد.
- وجود دم في براز طفلك.
- شعور الطفل بالدوخة أو الدوار.
- أي مخاوف أخرى قد تكون لديكم.

الحصول على النتائج

سيقوم طبيب طفلك بمناقشة النتائج معك. عادة ما تكون النتائج متاحة بعد 7-10 أيام من خزعة الكبد.

آخر تحديث: مارس 2024 بواسطة جين ويلوباي، ماجستير التمريض، ممرضة مجازة (المستوى الثالث)