

Uretraning meatal stenozi nima?

Uretraning meatal stenozi bu uretra teshigining (meatus) noodatiy torayishidir. Agar teshik haddan tashqari torayib ketsa, siydik siydik pufagidan oqib tushishda muammoga duch keladi va siydik pufagining to'liq bo'shamasligiga sabab bo'lishi mumkin. Agar uni davolamasa, bu siydik yo'li infeksiyalariga hamda buyrak bilan muammolarga olib kelishi mumkin.

Uretraning meatal stenozi xatna qilinganda ko'pincha yuz beradigan murakkablik sanaladi va siydikning uretra teshigiga muttasil achishtiruvchi ta'siridan hamda uretra teshigining taglik yoki kiyimga ishqalanishidan kelib chiqadi.

Uretraning meatal stenozi belgilari va simptomlari nimalardan iborat?

Bolalarda quyidagi simptomlar kuzatilishi mumkin:

- Peshob qilishda qiynalish
- Ko'p peshob qilish
- Uzoq muddat peshob qilish
- Siydik oqimining ingichkaligi
- Peshob qilishni boshlash va oqimini ushlab turishda qiynalish
- Hojatxonada siydik oqimini to'g'ri yo'naltirish
- Siydik bitta oqim emas, sochilib tushadi
- Peshob qilganda belning tortilishi yoki bukilishi

Ayrim bolalarning siydigida mikroskopik qon bo'ladi yoki peshob qilganda og'riq bo'ladi.

Uretraning meatal stenozi qanday davolanadi?

Bu kasallik meatoplastika deb nomlangan jarrohlik amaliyoti yordamida davolanadi. Uretra teshigi osti uni ochish va kengaytirish uchun kesiladi. Jarrohlik amaliyoti amaliyot xonasida umumiy anesteziya ostida o'tkaziladi, ammo uni shifoxonada mahalliy anesteziya qo'llab ham amalga oshirish mumkin.

Agar amaliyot xonasida o'tkazilsa, uretra teshigi kesiladi va uretra teshigi atrofiga singib ketadigan choklar qilinadi. Agar shifoxonada o'tkazilsa, uretra teshigida kichik kesish qilinadi, ammo choklar qo'yilmaydi.

Agar toraygan uretra teshigi tuzatilmasa, u peshob qilishni qiyinlashtirishi va siydik yo'li infeksiyalarini keltirib chiqarishi va buyrak shishishiga olib kelishi mumkin.

Jarrohlik amaliyotidan keyin nima bo'ladi?

Meatoplastikadan keyin bola uyg'oq bo'lgan holatda har 2 soatda choklar ustiga (agar bo'lsa) uchta bilda (neomitsin, polimiksin B va basitrasin) antibiotik malham surting. Undan tashqari, kuniga bir necha bor bir qism malhamni kesilgan joyga kiritish orqali meatal parvarish talab etilishi mumkin.

Farzandingiz dastlabki 24 soat davomida peshob qilganida achishishni his qilishi mumkin. Odatda ular agar o'zini juda noqulay his qilmasa, jarrohlikdan keyingi kuniyoq o'qishga qaytishi mumkin.

Farzandingizga kun davomida har bir necha soatda ichimlik ichiring, bu achishish hissiyotini kamaytirishga yordam beradi. Siydik quyuqligi qancha kam bo'lsa, achishish hissi shuncha kam bo'ladi. Sitrus sharbatlar va gazli ichimliklarni bermang.

Agar jarrohlik amaliyotidan keyin farzandingiz peshob qila olmasa yoki siydik oqimi ingichka yoki sochilib tushsa shifokorga qo'ng'iroq qiling.

Last Updated: 09/2025 per Katie Potts, RN