

[H3] علاج اليرقان لدى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي

تستخدَمُ علاج اليرقان لدى المصابين بالتهاب الكبد الوبائي نوعين من الأدوية المضادة للتهاب الكبد الوبائي (A) أو (IgA) (أو اليرقان الوبائي المزمن (TTG-IgA)).

ومن أجل ضمان تلقي جرعة دقيقة، يجب على طفلك أن يأكل كمية صغيرة من الطعام على الأقل في كل مرة يتناول فيها الطعام. يجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك.

ويُعطى البنزوديازيبين من المضادات الحيوية التي لا تستخدم عادةً لعلاج التهاب الكبد الوبائي. إذا كان طفلك يتعب عن نظام غذائي خفيف من المضادات الحيوية، فيمكن أن يُعاد إدخال المضاد الحيوي في طعام طفلك حتى يتحسن. يجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك.

[H3] التهاب الكبد الوبائي (A) "المنظار" (علاج سحب خزعة) يُظهر المنظار ما إذا كانت الأمعاء متهيجة ومتضررة.

ويُعدُّ التنظير الهضوي أحد الاختبارات التي لا تستخدم عادةً لعلاج التهاب الكبد الوبائي. ويتم إجراء فحصي المنظار الهضمي للتحقق من سلامة الأمعاء. ويتم إجراء فحصي المنظار الهضمي للتحقق من سلامة الأمعاء. ويتم إجراء فحصي المنظار الهضمي للتحقق من سلامة الأمعاء.

سيقوم الطبيب بالفحص في المختبر لمعرفة الالتهاب الوبائي. يجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك.

[H2] علاج التهاب الكبد الوبائي

لا تتوفر علاجات شافية لالتهاب الكبد الوبائي. الهدف للأشخاص المصابين به هو الحد من الأعراض. يجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك.

ومن أجل علاج اليرقان الوبائي، يجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك.

[H2] علاج التهاب الكبد الوبائي

يجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك.

يمكن أن يُساعِدَ علاج التهاب الكبد الوبائي في إجراء اختبارات على عادات الأكل. يجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك. ويجب أن تتناول الطعام في وقت واحد مع طفلك.

- فهم ما هو التهاب الكبد الوبائي من اليرقان
- تجنب تناول الأطعمة التي قد تضر الكبد
- تجنب تناول الكحوليات

- التأكّد من أن طفلك لي فوالق ظل تغذية لالز لمهلن مولات طور
- ال بحث عن الهائل خالية من الوغتين لأطعم طفلك المفضلّة

[H2] | المواليت علاقة الهداء البطني

قيس ببتش خي صال دالمب طرايوت وال ولقي نيمت كيف ألسرة م عن مطح حياي الخالي من الوغتين ليل طفلها. والخبرال سار هو أزالع الحق دصار لك أكثر وذا وترحبا أالش خاص ال فيزي جبع لي هتجن بال فتويين س يفرل كغري قرع اي طفل لك الموارد ال زم في مساعتك عملتلك يف.

تقدم لعيد من مواعيل الويب لتفهم والد عمل من اعدة ظل انفي لضاظ فتوين مطح حياة خال من ال فتوين. في منتفب سريين يهثي لالأطال) Cincinnati Children's (فوصييم ايلي:

- فوسرة عاي مريض ال دالمبطني (Celiac Disease Foundation) متوفر بلحططبية وموئلوق فيية لل مرضى الأطباء بجلب الفاع الفوسري اس اتال عامّة
- جمعية مرضى عدت حمل ال فتوين (Gluten Intolerance Group) متقدم ال دعم والمواليت علمي فين مطح حياة خال من الوغتين
- جمعية إعاشة ال دالمبطني (Beyond Celiac) متقدم ال دعم والمواليت علمي فيية الأبحاث
- ال رابطة وطني لمرض ال دالمبطني (National Celiac Association) متقدم المواليت علمي فيية الفاع عن حقوق ال عالت
- لبيدتن اول الطعام الأمان (Triumph Dining Guide) يشارك المواليت دعم لها لزم بلتن اول للطعام في ال خارج
- قوع ويب LillyB's ليقدم اقتراحات بش أن أطلع مع فإخ اليّة من الأختين
- موق عوي ب"حي الخالية من ال فتوين" (Gluten-Free Living) ي عرض وصفات صائح حولن مطح حياة

تمت آخر مراجعته في و/أيار 2021 بولسطة داني المألون