

التغذية عبر أنبوب فغر المعدة بالمحقن

نظرًا لعدم قدرة طفلك على تناول طعامه عبر الفم أو حاجته للحصول على المزيد من السعرات الحرارية للنمو، فسنقدم له الغذاء عبر أنبوب فغر المعدة الذي يوضع داخل معدة طفلك.

يسمى أنبوب فغر المعدة عادة "g-tube". ستساعدك هذا الإرشادات في إطعام طفلك عبر هذا الأنبوب.

المستلزمات

- محقن إن فت (EnFit) (35 مل أو 60 مل)
- حليب صناعي
- كوب قياس
- مجموعة وصلات في حال الرغبة، مجموعة وصلات دقيقة (Bolus extension set) لزر أنبوب فغر المعدة

الإجراء

1. اشرح الإجراء لطفلك.
2. اغسل يديك بالماء والصابون.
3. اجمع كل المستلزمات.
4. اسكب المقدار الصحيح من الحليب الصناعي في كوب قياس نضيف أو في زجاجة إرضاع نظيفة.
5. ضع الطفل في وضعية مريحة. أجلس الطفل، إن أمكن، فوق كرسي عالٍ أمام الطاولة أثناء أوقات الوجبات.
6. ثبت طرف المحقن داخل أنبوب التغذية أو مجموعة الوصلات الدقيقة عند زر ميك-كي (MIC-KEY) أو بارد (Bard).
7. اشطف الأنبوب بمقدار 3 إلى 5 مل من الماء أو حسب توجيهات ممرضك أو طبيبك قبل البدء في التغذية بالحليب.
8. اسكب الحليب الصناعي داخل المحقن ببطء.
9. افتح مشبك أنبوب التغذية. تحكم بسرعة التغذية عبر رفع المحقن أو خفضه. يجب أن تستغرق التغذية مقدار الوقت نفسه تقريبًا الذي يستغرقه الطفل في رضاعة الحليب الصناعي، أي نحو 15 إلى 20 دقيقة. أوقف التغذية إن شعر الطفل بالغثيان أو أظهر علامات عدم الراحة، أو عند حدوث انتفاخ في البطن أو القيء أو صعوبة التنفس.
10. في حالة عدم قدرة الطفل على التغذية عبر الفم، فحفزه بإعطائه النهاية أثناء التغذية عبر أنبوب فغر المعدة. ناقش طبيب طفلك أو ممرضه أو معالج الوظيفي في اقتراحات التحفيز الفموي للطفل الأكبر عمرًا.
11. بعد الانتهاء من إعطاء كامل الحليب، اشطف الأنبوب بالماء حسب إرشادات طبيبك أو ممرضك، وأعد تغطية أنبوب فغر المعدة أو افصل كامل الأنبوب وأغلق الغطاء على زر أنبوب فغر المعدة.
12. حاول حمل طفلك على التجشؤ بعد كل إطعام إن أمكن.
13. اشطف مستلزمات التغذية بالماء الدافئ بعد كل إطعام واطركها تجف في الهواء. غير المحقن ومجموعات الوصلات كل أسبوعين.

إن ارتد الحليب الصناعي:

- غير وضع الأنبوب لإبطاء سرعة التدفق
- غير وضعية الطفل
- اشطف أنبوب التغذية بمقدار 3 إلى 5 مل من ماء الصنبور

نصائح الأمان

- تذكر أن تشطف أنبوب التغذية بالماء بين كل وجبات التغذية وإعطاء الأدوية.
- راقب الطفل لملاحظة مشكلات التغذية: الغثيان أو القيء أو عدم الراحة أو الانتفاخ أو تغيير نمط البراز.
- اتصل بطبيبك أو ممرضك إن ساورتك أي مخاوف متعلقة بالتغذية.